



Periplaneta americana

CICLO VITALE
(vedi immagine sotto)

Lunghezza fino a 38 mm.

Le ooteche schiudono in 1-2 mesi e dopo 5-12 mute passano ad adulti.

In un ciclo vitale produce da 15 fino a 90 ooteche

L'ooteca contiene dalle 12 alle 20 uova



DANNI E DIFFUSIONE

Ambienti caldo umidi in genere.

Colonizza aree con forte tendenza agli scambi commerciali
(container,vagoni,aeroporti)

ABITUDINI

Onnivora

PREVENZIONE

Trappole a colla per il monitoraggio.

CONTROLLO

Insetticida liquido abbattente e residuale

ALTRO

Le blatte sono presenti da oltre 350 milioni di anni e sono quindi tra le specie più antiche del pianeta. Di abitudini notturne le blatte possono arrampicarsi su superfici lisce e sono buoni corridori. In grado di appiattirsi notevolmente riescono a colonizzare tutti gli ambienti antropizzati con qualche particolarità tra specie e specie. Tutte le blatte subiscono una metamorfosi graduale che è caratterizzata da tre differenti stadi: **uovo**, **alcuni stadi distinti di ninfa (neanide) ed infine adulto**. I tempi di sviluppo in ogni stadio della loro vita varia a seconda della specie e sono influenzati dalle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa e disponibilità al cibo). L'intero ciclo vitale può durare da un mese a più di un'anno. Può causare danni gravi a derrate alimentari sia per insudiciamento, che per contaminazione fisica e biologica delle stesse derrate e dei macchinari, attrezzature, impianti di condizionamento.
In media il loro corpo contiene il 60% in peso di proteine ed il 25 % di grassi.

