


	Formica nera <i>Lasius Niger</i>
CICLO VITALE	Da uovo a larva: 15 giorni. Da larva a pupa: 10 giorni. Da pupa ad immago: 15 giorni Vita regina: anche fino a 20 anni. La vita degli operai dura dai 4 ai 5 anni
LUNGHEZZA	Lunga mediamente dai 2 ai 5 mm. La regina può raggiungere anche i 9 mm
NUMERO INDIVIDUI	Il numero in media varia dai 15,000 ai 30,000 individui
NUTRIMENTO-DIFFUSIONE	Le operaie, che presentano un addome semi-estensibile per contenere i liquidi zuccherini e si nutrono soprattutto della melata rilasciata da emetteri parassiti delle piante come afidi e cocciniglie, con cui vivono in simbiosi e proteggono dai predatori distribuendoli sulle piante nell'ambiente esterno al nido.
TEMPERATURA IDEALE	26-27°C
DANNI	Nessun danno o rischio igienico sanitario conosciuto esclusa la contaminazione diretta degli alimenti.
CONTROLLO	Disinfestazione tradizionale con insetticida liquido a bagnare le superfici interessate dai camminamenti. I prodotti possono essere microincapsulati e non, Non hanno comunque scopo preventivo data la scarsa residuabilità specialmente nelle aree esterne.
CURIOSITA'	Sciama a giugno-agosto Iberna 3-4 mesi Può essere allevata artificialmente
 Ant Life cycle	