




**Cerambicidi (capricorno delle conifere o delle case)**  
*Hylotrupes bajulus Linnaeus*

|  |   |
|--|---|
| <b>CICLO VITALE</b><br>(vedi immagine sotto) | In genere di tre-quattro anni ma può raggiungere anche i 17 anni in caso di limitate risorse trofiche ed ambientali<br>Bruno scuro. Non possiede la fitta peluria che contraddistingue il Capricorno delle latifoglie.<br>170 uova in piccoli grappoli. 15-25 mm. Fori di 1 centimetro. |
| <b>DANNI E DIFFUSIONE</b>                    | Europa, Asia, Africa e America settentrionale   |
| <b>ABITUDINI</b>                             | Predilige di norma legno giovane di Abete e larici-Conifere in genere, sia che vive che morte, lavorate e non (travi, travicelli ecc)   |
| <b>PREVENZIONE</b>                           | Monitoraggio del legno  |
| <b>CONTROLLO</b>                             | Iniezioni con tarlicida liquido e spennellature<br>Fumigazione e trattamento con gas tossico ove possibile (azoto, anidride carbonica ecc)  |
| <b>ALTRO</b>                                 | La camera pupale viene formata a fine ciclo e dopo aver forato il legno esterno l'adulto esce dopo 10 giorni. Dai fori di sfarfallatura difficilmente si può risalire al grado di infestazione in quanto da uno stesso foro possono fuoriuscire più esemplari.                          |



©PK-photography.blogspot.com

Il presente documento contiene informazioni legali riservate esclusivamente al destinatario. Il ricevente, se diverso dal destinatario sopra indicato, è avvertito che qualunque utilizzazione o copia di questo documento è rigorosamente vietata. Se è stata ricevuta per errore, vogliate scusarci ed informarci immediatamente per telefono, fax od e-mail e provvedere all'immediata distruzione del documento stesso. In carenza di ciò potrebbero ritenersi applicabili gli artt.616 e ss. codice penale.