

ITALIA

RPM

Lotta antimurina



SCENA DEL CRIMINE - VIETATO L'INGRESSO



www.bellabs.com

ARMI

Stazioni di adescamento PROTECTA® & PROTECTA® EVO®



Ampia offerta di esche



Trappole collanti TRAPPER®



Ampia offerta di trappole meccaniche



PRODOTTI DI PRIMA QUALITÀ DAL LEADER PER IL CONTROLLO DEI RODITORI

In qualità di leader mondiale nelle tecnologie per il controllo dei roditori, Bell Laboratories continua a garantire leadership e gestione responsabile per il segmento di mercato del controllo dei roditori nel settore delle disinfestazioni. Il nostro scopo è garantire qualità, funzionalità e innovazione.

STAZIONI DI ADESCAMENTO ANTIMANOMISSIONE PROTECTA E PROTECTA EVO

Dalle necessità di esche più complicate fino ad arrivare a quelle più discrete, Bell Laboratories offre ai professionisti del settore una scelta di stazioni di adescamento antimanomissione versatili e sistemi di fissaggio per essere all'altezza di ogni situazione.

FORMULAZIONI DI ESCHE RODENTICIDE ECCEZIONALI

La linea di rodenticidi di Bell Laboratories offre la più ampia gamma di esche per roditori disponibile sul mercato. I rodenticidi di Bell Laboratories contengono esclusivamente ingredienti alimentari di prima qualità per ottenere i migliori risultati possibili sul campo. L'appetibilità e l'efficacia dei prodotti Bell Laboratories non hanno rivali nel settore.

TRAPPOLE COLLANTI E MECCANICHE

Bell Laboratories ha messo in pratica le proprie ampie conoscenze sul comportamento dei roditori e le proprie competenze ingegneristiche allo scopo di sviluppare una gamma di trappole adesive e meccaniche. Le formulazioni collanti di Bell Laboratories rappresentano il risultato di importanti test e ricerche condotti per determinare la combinazione ideale tra una presa immediata e una stretta elastica, due fattori necessari per una percentuale di cattura più elevata possibile.

STABILIMENTO PRODUTTIVO

Bell Laboratories è un'azienda produttiva con integrazione verticale. I prodotti Bell Laboratories sono progettati, testati e prodotti nel moderno stabilimento di Madison, Wisconsin (USA), che ospita gli uffici e i laboratori per i test chimici e biologici.

GESTIONE RESPONSABILE DELL'AMBIENTE

Bell Laboratories continua a collaborare con gruppi di tutela e agenzie governative di tutto il mondo per liberare gli ecosistemi dalle specie invasive e per ripristinare l'equilibrio naturale. Per maggiori informazioni, visitare il sito: belllabs.com/preservation-projects

GLI OBIETTIVI DI

RPM

RODENT PEST MANAGEMENT

- Esaminare, identificare e analizzare
- Comprendere le condizioni ambientali e i rischi per la sicurezza
- Comunicare e attuare il piano di sanificazione e di riduzione delle zone di rifugio
- Selezionare i metodi di controllo appropriati: esche, trappole o entrambi
- Riconoscere e attuare misure di esclusione per ridurre i casi di recidività
- Determinare e stabilire piani di manutenzione periodica per un controllo a lungo termine

INDICE

- 2-4 Biologia dei roditori
- 5 Comportamento e abilità dei roditori
- 6-7 Ispezioni
- 8-9 Misure antiroditori
- 10-11 Rodenticidi
- 12 Disinfestazione atossica
- 13 Sicurezza delle stazioni di adescamento



Biologia dei roditori

Esistono differenze specifiche tra ratti e topi. Identificando adeguatamente le diverse specie di roditori, è possibile selezionare i prodotti e le strategie operative più adatti per il controllo di una determinata tipologia.



Anche se hanno le stesse dimensioni di quelli di molti insetti, gli escrementi di topo contengono peli e presentano estremità appuntite.



DIMENSIONI EFFETTIVE

Topo domestico

Una famiglia di 6 topi in un garage in disordine può raggiungere le 50/60 unità in soli 90 giorni.

Escrementi con estremità arrotondate



DIMENSIONI EFFETTIVE



ORECCHIE PIÙ PICCOLE

CODA PIÙ CORTA

NASO SMUSSATO

Ratto norvegese

Un ratto norvegese può rosicchiare un tubo di piombo.

Escrementi con estremità appuntite



DIMENSIONI EFFETTIVE



ORECCHIE PIÙ GRANDI

CODA PIÙ LUNGA

NASO APPUNTITO

Ratto nero

Grazie alle dita più lunghe e agli speciali polpastrelli sotto le zampe, i ratti neri, o ratti dei tetti, si rivelano ottimi scalatori.

I SOSPETTATI



Nome scientifico:	<i>Rattus Norvegicus</i>	<i>Rattus Rattus</i>	<i>Mus Musculus</i>
Colore:	Rosso brunastro	Grigio scuro	Nero, grigio cenere
Peso medio:	280-480g	225g	20g
Lunghezza: (compresa la coda)	30-45 cm	33-43 cm	15-18 cm
Corpo:	Corpo massiccio, naso smussato	Corpo snello, naso appuntito	Testa e corpo piccoli
Maturità sessuale:	2-3 mesi	2-3 mesi	da 1 mese a 1 mese e ½
Gestazione:	23 giorni	22 giorni	19 giorni
Numero di cuccioli:	6-12 per cucciolata	6-8 per cucciolata	5-6 per cucciolata
Numero di cucciolate:	In media 4-7 all'anno	In media 4-6 all'anno	In media 8 all'anno
Alimentazione:	Carne, pesce, granaglie, quasi tutto	Frutta, verdura, semi, cereali	Granaglie, cereali, carne, pesce, ecc.
Quantità media giornaliera di cibo:	28-85 g di cibo	28 g di cibo	3 g di cibo
Consumo di acqua:	28 ml di acqua	28 ml di acqua	1,5 ml di acqua
Durata di vita di un esemplare adulto:	18 mesi	18 mesi	15-18 mesi
Feci:	Estremità arrotondate	Estremità appuntite	Estremità appuntite
Nidi:	Tane interrate, a 28-135 metri da cibo e acqua	Alberi/tetti, a 30-90 metri da cibo e acqua	Angoli, a 3-9 metri da cibo e acqua

I sensi dei roditori

1. Vista

- I roditori sono quasi ciechi e utilizzano il tatto per orientarsi
- Per rovistare in aree buie ricorrono al loro seppur limitato senso della vista

2. Gusto

- Con il senso del gusto i roditori riescono a rilevare fino a 250 parti per miliardo
- I roditori appena nati assaggiano attraverso il latte materno i cibi di cui si nutre la madre, per i quali sviluppano una predilezione crescendo
- I roditori reagiscono negativamente agli alimenti che procurano loro malessere e anche se accade una sola volta ricorderanno sempre l'alimento incriminato
- Se privati di una determinata sostanza nutriente, i roditori individuano i cibi in grado di sopperire a tale esigenza, dando a essi la precedenza nella propria dieta fino a quando il fabbisogno non viene soddisfatto

3. Olfatto

- Circa l'1% dei geni del ratto incide sul senso dell'olfatto
- Essi producono e rilasciano feromoni per scambiarsi informazioni con gli altri roditori (ad esempio lo stato della colonia, il comportamento riproduttivo, ecc.)
- I roditori usano il senso dell'olfatto per trovare il cibo

4. Tatto

- I roditori hanno lunghi baffi, o vibrisse, su tutto il corpo, ma quelli sul muso sono più lunghi. Questi peli vengono utilizzati per orientarsi mentre si spostano lungo pareti o altri oggetti. Per tale ragione, è raro che i roditori si muovano negli spazi aperti; aspetto da tenere presente quando si piazzano esche e trappole
- Le zampe dei roditori sono dotate di polpastrelli particolarmente sensibili; pertanto, è opportuno evitare di posizionare stazioni di adescamento di metallo che potrebbero diventare troppo calde o fredde

5. Udito

- I roditori comunicano tra loro con frequenze ultrasoniche (sotto forma di squittii, ticchettii e gemiti) che l'orecchio umano non riesce a percepire
- Difficilmente i roditori riescono a determinare la posizione di un oggetto in base al suono

6. Percezione cinestetica: capacità di rilevare la posizione del corpo, il peso o il movimento di muscoli, tendini e articolazioni

- I roditori riproducono movimenti dei muscoli memorizzati con i quali rilevano sostanzialmente anche le caratteristiche dell'ambiente che li circonda
- In questo modo, memorizzano l'ambiente e il modo in cui muoversi in esso senza utilizzare la vista
- Questa abilità si sviluppa nel momento in cui il roditore acquista una certa familiarità con l'ambiente in cui si trova

I denti del ratto

- I ratti possono mordere praticamente di tutto; i loro denti sono molto duri e sono in grado di masticare sei volte al secondo
- Gli incisivi crescono di 13 cm l'anno
- I ratti possono arrivare ad applicare una forza di 3.000 kg per pollice quadrato



Comportamento generale

I roditori sono animali notturni

- Si tratta di una particolare modalità di difesa, in quanto la maggior parte dei loro nemici non sono attivi nelle ore notturne
- In genere i roditori si alimentano di notte: l'attività diurna indica che l'infestazione ha raggiunto livelli elevati

Abitudini alimentari

- Roditori commensali sono onnivori e opportunisti, fanno razzia di alimenti di qualsiasi tipo (granaglie, carni, pesce, frutta, ecc.) e si nutrono del cibo che viene lasciato "a loro disposizione"
- I ratti accumulano riserve di cibo che possono durare settimane
- Tutti i roditori tenderanno ad accumulare il cibo in luoghi nei quali pensano di poterlo consumare in tranquillità

Abitudini di movimento

- Utilizzano gli angoli per ripulirsi, mangiare e costruire i nidi
- Seguono determinate piste che si vengono a creare lungo le condutture e le scie di feromoni

Gerarchia

- Tra i roditori si stabilisce una gerarchia che vede gli esemplari dominanti arrivare a nutrirsi per primi e occupare le zone di nidificazione migliori. Se le condizioni per l'alimentazione e la costruzione di rifugi sono particolarmente favorevoli, anche i roditori meno dominanti potranno sopravvivere, ma potrebbero cibarsi durante le ore diurne.

Alcune curiosità

I roditori occupano il secondo posto tra i mammiferi per successo evolutivo:

- N. 1: **Homo sapiens**
- N. 2: **Topo domestico**
- N. 3: **Ratto norvegese**

I topi:

- Sono presenti in numero maggiore e vivono in tutte le condizioni climatiche
- Frequentano sia ambienti esterni che interni
- Sono curiosi
- Mordicchiano nervosamente
- Tendono a ripulirsi spesso il pelo

I ratti:

- Sono neofobici (generalmente non amano le situazioni nuove)
- Sono mammiferi che, una volta trovato un ambiente favorevole, consumano grandi quantità di cibo
- Tendono a pulirsi una o due volte al giorno, nei loro nidi
- Per natura, i ratti norvegesi sono scavatori e tenderanno a costruire la propria tana in prossimità delle fonti di acqua e cibo, in zone ideali per trovare rifugio
- I ratti dei tetti sono ottimi scalatori e tendono a fare il nido in posizione rialzata

Abilità dei ratti

- Da fermo, un ratto può compiere un salto in verticale di quasi mezzo metro. Mentre corre è in grado di saltare in orizzontale per 1 metro, in media
- I ratti possono cadere da un'altezza di cinque piani senza procurarsi danni
- I ratti sono abili nuotatori; i ratti norvegesi possono affrontare una corrente di quasi 50 km/h senza affogare
- I ratti riescono ad arrampicarsi con facilità lungo strette intercapedini

L'importanza delle ISPEZIONI

Nell'ambito dei servizi di controllo dei roditori si registra il più alto numero di richiami. Se siete tentati di saltare o velocizzare l'ispezione iniziale dei locali, non lo fate! È assolutamente fondamentale effettuare quest'operazione con la massima scrupolosità. L'ispezione, che di solito inizia all'aperto per poi continuare all'interno, getta le fondamenta per le fasi successive del lavoro.

ASPETTI PRINCIPALI DA INDIVIDUARE:

- Specie dei roditori
- Gravità dell'infestazione
- Lacune nelle misure antiroditori
- Aree di intensa attività
- Strumenti da utilizzare

LE FASI PRINCIPALI DELL'ISPEZIONE

- Porre domande al cliente per individuare gli indizi e ricostruire la storia dell'applicazione
- Le ispezioni devono essere tridimensionali (in alto, in basso e nelle aree circostanti)
- Individuare le fonti di cibo (alimenti per animali, alberi di agrumi, ecc.)
- Individuare le aree di pressione più elevata
- Educare il cliente fin dall'inizio

AREE COMUNI DA ESAMINARE

- I roditori utilizzano le condutture come punti di passaggio all'interno degli edifici e nelle aree circostanti
- Assicurarsi che le aree intorno alle tubazioni e alle condutture siano sigillate per impedire l'accesso ai roditori
- Aree con condizioni di scarsa igiene
- Opportunità di esclusione
- Fonti di calore
 - Pannelli di accesso
 - Controsoffitti
 - Intercapedini sotto il pavimento
 - Magazzini
 - Spazi dietro attrezzature ed elettrodomestici

Ispezioni accurate seguite dal posizionamento di esche/trappole adeguate = meno richiami



STRUMENTI DI ISPEZIONE CONSIGLIATI

- Torcia elettrica
- Matita e blocco per appunti
- Sonda espandibile
- Raschietto
- Lampada di Wood
- Righello
- Binocolo
- Macchina fotografica digitale
- Elenco di controllo per l'ispezione
- Igienizzante per mani
- Scala
- Dispositivi di protezione individuale
- Lumitrack (vedere pagina 12)
- IL CLIENTE



Determinare la GRAVITÀ dell'infestazione



Verificare la presenza di tracce lasciate dai roditori

Escrementi:

Informazioni utili ricavate dagli escrementi:

1. Età

- Gli escrementi più recenti sono lucidi e hanno una consistenza simile allo stucco
- Gli escrementi vecchi sono duri e friabili

2. Dimensioni degli infestanti

- Feci di varie dimensioni indicano la presenza di esemplari giovani e adulti
- Una grande quantità di escrementi è il segno di un'infestazione diffusa

3. Aree ad alta attività nelle quali è necessario l'utilizzo di strumenti di controllo dei roditori

Nidi/zone di rifugio

Segni di morsi

Topi

- 1-2 mm di larghezza
- Fori piccoli, taglio netto

Ratti

- 4 mm di larghezza
- Fori grandi con contorni irregolari, come strappati

Segni di strofinamento

- Spostandosi lungo le pareti i roditori lasciano segni di strofinamento prodotti dall'azione combinata del grasso della pelle e di polvere o residui

- Se le tracce sono ancora spalmabili significa che sono fresche



Nidi/zone di rifugio



Segni di morsi



Segni di strofinamento

Uno degli errori più comuni nel controllo dei roditori consiste nel sottovalutare le dimensioni della popolazione e di conseguenza nel posizionare un numero insufficiente di esche o stazioni di adescamento. Durante l'ispezione vedrete vari segni della presenza di roditori. Queste informazioni consentono di determinare la portata dell'infestazione e i luoghi in cui i roditori si muovono e si alimentano. Riuscendo a valutare accuratamente la gravità della situazione e a localizzare il problema potrete individuare più efficacemente gli strumenti da utilizzare e le aree in cui collocarli per ottenere i risultati migliori.

I punti di passaggio dei roditori

- Davanzali
- Assi di recinzioni
- Fondamenta
- Cavi elettrici
- Tubi
- Rami di albero
- Condutture

Le tane dei roditori

- I ratti norvegesi nidificano in tane ipogee
- Per scavare le tane, profonde generalmente da 125 a 150 cm, prediligono aree ricche di vegetazione che garantiscono loro adeguata protezione



Le tane dei roditori

Atti vandalici

ELIMINARE le condizioni favorevoli



Durante la procedura di ispezione, è importante individuare le condizioni favorevoli che hanno permesso l'insorgere del problema roditori e attuare quindi le misure correttive necessarie

Riduzione delle zone di rifugio

- Eliminare le fonti di cibo e acqua dei roditori.
- Individuare le zone di rifugio e consigliare al cliente i metodi migliori per eliminarle sia all'interno che all'esterno.
- Tagliare l'erba e sfoltire la vegetazione con regolarità: l'erba alta protegge i roditori dai predatori.
- Potare regolarmente alberi e piante dalla chioma sporgente, la cui ombra crea aree buie nelle quali i roditori si sentono sicuri e protetti.
- Rimuovere eventuali detriti accumulati all'esterno della struttura. I rifiuti e il disordine intorno all'edificio costituiscono condizioni favorevoli in cui i roditori possono trovare rifugio e procurarsi cibo.
- Si consiglia di costruire un muretto in cemento o roccia frantumata dello spessore di 50 cm intorno alla struttura.

Migliorare le pratiche igienico-sanitarie

I roditori sono animali opportunisti che si nutrono di qualsiasi alimento di cui l'uomo fa a meno. I cassonetti in prossimità degli esercizi commerciali costituiscono una delle aree più a rischio per la proliferazione dei roditori.

I contenitori dei rifiuti dovrebbero...

- Essere di dimensioni sufficientemente grandi per evitare che la spazzatura trabocchi
- Essere dotati di coperchi a chiusura ermetica
- Se possibile, essere posti a una distanza di 23-46 metri dall'esterno della struttura
- Venire svuotati regolarmente



MISURE ANTIRODITORI

Identificare le aree che necessitano di misure antiroditori durante la procedura di ispezione. Non procedere all'applicazione di misure antiroditori prima di aver ridotto drasticamente la popolazione esistente.



Impedire l'ingresso dei roditori all'interno della struttura

- Chiudere tutti i fori presenti nelle pareti esterne e interne.
- Fare in modo che non siano presenti aperture con diametro superiore a 0,5 cm, in particolare in prossimità di porte e finestre.
- Installare dispositivi di chiusura automatica sulle porte utilizzate con maggiore frequenza.
- Applicare guarnizioni in vinile, gomma o setole sotto le porte dei garage per chiudere eventuali fessure.
- Le guarnizioni intorno a tubi, scarichi e condotti di sfiato devono essere ben aderenti.
- Le canne fumarie devono essere dotate di copertura e in buone condizioni.



1,25 cm

I ratti riescono a passare in un'apertura larga 1,25 cm o del diametro di un pollice



0,5 cm

I topi attraversano aperture di mezzo centimetro o del diametro di un mignolo

Materiali antiroditore consigliati

- Maglia di rame
- Stoffa resistente
 - Spessore minimo 19
- Metallo perforato
 - Spessore 24
- Lamiera (zincata)
 - Spessore minimo 26
- Malta di cemento
 - Miscela minima 1:3



SCEGLIERE L'ESCA PIÙ ADATTA

L'esca più indicata va selezionata in base al livello di attività dei roditori. Potrebbe trattarsi di una nuova applicazione con un'infestazione intensa, un'applicazione esistente in presenza di roditori resistenti o un programma preventivo da impostare per monitorare e tenere lontani gli animali. La corretta selezione e applicazione delle esche descritte di seguito determinerà la buona riuscita delle operazioni di controllo dei roditori.

NOTRAC®

PRINCIPIO ATTIVO:
Bromadiolone

TIPO: Anticoagulante di seconda generazione

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO:
La vitamina K1 è immediatamente disponibile

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Questo anticoagulante di seconda generazione a bassa tossicità è l'ideale in aree in cui deve essere tenuta in considerazione la presenza di animali non bersaglio
- I roditori possono ingerire la dose tossica in un unico pasto
- I roditori possono continuare a consumare l'esca anche dopo l'ingestione di una dose tossica

QUANDO È INDICATO:

- Per infestazioni pesanti con una forte competizione per il cibo
- Per la gestione di infestazioni persistenti
- In presenza di invasori occasionali per assicurarsi che ingeriscano una dose letale in un singolo pasto



SOLO®

PRINCIPIO ATTIVO:
Brodifacoum

TIPO: Anticoagulante di seconda generazione

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO:
La vitamina K1 è immediatamente disponibile

CARATTERISTICHE GENERALI:

- I roditori possono ingerire la dose letale in un unico pasto
- I roditori possono continuare a consumare l'esca anche dopo l'ingestione di una dose tossica

QUANDO È INDICATO:

- Per infestazioni pesanti con una forte competizione per il cibo
- Per infestazioni persistenti



*PER I PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO COMPLETI, CONSULTARE L'ETICHETTA DEL PRODOTTO.



BLOX ESTRUSO

- ▶ La forma di esca più utilizzata
- ▶ Altamente appetibile e resistente agli agenti atmosferici
- ▶ Il blocco presenta numerosi spigoli, che invitano i roditori a rosicchiarlo
- ▶ È provvisto di un foro al centro per il fissaggio alle aste delle stazioni di adescamento antimanomissione



ESCA MORBIDA

- ▶ Altamente resistente agli agenti atmosferici
 - Resistente a muffa e umidità
 - Resistente a temperature elevate
 - Resistente a temperature molto basse
- ▶ La scelta più indicata per roditori abituati a un regime alimentare ricco di grassi e oli

A prescindere dal tipo di esca Bell scelta, è comunque decisamente raccomandato l'utilizzo delle stazioni di adescamento antimanomissione **PROTECTA®** o **PROTECTA® EVO®**.



Adescamento su 3 linee di difesa

La maggior parte dei programmi di adescamento inizia dopo che l'infestazione è stata scoperta. Con l'adescamento lungo le tre linee di difesa si lavora per prevenire l'insorgere dell'infestazione.

Perimetro della proprietà:


- Posizionare le stazioni di adescamento antimanomissione lungo il perimetro della proprietà
- Utilizzare esche BLOX applicabili all'interno della stazione di adescamento su aste di fissaggio verticali o orizzontali
- Scegliere il principio attivo più adatto per ridurre il rischio di avvelenamento indiretto di animali non bersaglio

Adescamento all'esterno:

- I roditori sono attratti dalle correnti di aria calda o dall'odore di cibo
- Le trappole o le stazioni di adescamento antimanomissione andrebbero posizionate ogni 10-15 m a seconda della gravità dell'infestazione
- Piazzare l'esca o le trappole vicino a ogni porta di ingresso

Adescamento all'interno:

- Il posizionamento del dispositivo antiroditori dipende dal tipo di infestazione che si deve affrontare:
TOPI: Effettuare un'applicazione ogni 2,5-3,5 metri a seconda della gravità dell'infestazione
RATTI: Effettuare un'applicazione ogni 4,5-9 metri a seconda della gravità dell'infestazione



I 6 principi chiave per un adescamento ben riuscito

1 Scegliere l'esca più indicata in base al risultato desiderato

La scelta del rodenticida dipende dalle condizioni ambientali e dalla gravità dell'infestazione.

2 Leggere l'etichetta del rodenticida prima di posizionare l'esca

Le istruzioni riportate sull'etichetta forniscono informazioni utili sul posizionamento dell'esca. "L'etichetta è legge."

3 Posizionare l'esca nelle aree di passaggio dei roditori

L'ispezione sarà servita per identificare le aree problematiche e le specie coinvolte. Posizionare l'esca in modo che ratti e topi la possano trovare.

4 Effettuare la giusta quantità di applicazioni

Posizionare un numero di esche sufficienti per liberarvi completamente dei roditori. Rinnovare le esche con regolarità e rimuovere quelle danneggiate o deteriorate.

5 Utilizzare le stazioni di adescamento nei casi in cui sia presente un rischio per la sicurezza

Le stazioni di adescamento antimanomissione tengono lontani bambini, animali domestici e altre specie non bersaglio.

6 Ove possibile, eliminare le fonti di cibo, acqua e rifugio a disposizione dei roditori

Accertarsi di aver ridotto la popolazione prima di applicare misure antiroditore, poiché l'alterazione dell'ambiente potrebbe portare gli animali ad assumere comportamenti frenetici.



Un approccio NON TOSSICO alla disinfestazione

Si registra un'attenzione sempre più marcata verso i programmi di disinfestazione integrati (IPM, Integrated Pest Management), ma anche gli strumenti atossici per il controllo dei roditori sono sempre più utilizzati. Esistono molti metodi non tossici ed economicamente convenienti per monitorare e controllare i roditori.

TRAPPOLE MECCANICHE

Trappole a scatto

- Individuare i punti di passaggio dei roditori e posizionare le trappole in prossimità degli stessi
- L'attrattivo Provoke™ Rat o Mouse è la soluzione ideale da applicare all'interno delle trappole meccaniche
 - Molto diffusa è anche la scelta di posizionare materiale per la costruzione dei nidi come fili di cotone o cordini
- In presenza di bambini e animali domestici, è opportuno sistemare le trappole a scatto nelle stazioni di adescamento antimanomissione
- I feromoni lasciati dal roditore all'interno o in prossimità della trappola attireranno altri roditori verso il dispositivo



I feromoni lasciati dal roditore all'interno o in prossimità della trappola attireranno altri roditori verso il dispositivo

Trappola per topi con molteplici chiusure a scatto

- Identificare le piste attive e posizionare le trappole meccaniche in aree buie, lungo le pareti e dietro gli oggetti
- La collocazione ideale nelle strutture commerciali è su entrambi i lati delle porte interne ed esterne
- Per facilitare e velocizzare le operazioni di manutenzione, utilizzare una tavola collante in combinazione con la trappola meccanica



ADESIVI (tavole e trappole collanti)

- Le tavole collanti possono essere usate per monitorare la presenza di roditori e insetti
- Posizionare le tavole collanti presso i punti di passaggio utilizzati dai roditori
- Non esporre le tavole collanti a polvere, detriti e umidità

Non utilizzare le tavole collanti negli angoli



DETEX™ con Lumitrack®

► Per monitoraggio e localizzazione

- In caso di applicazioni sensibili, utilizzare Detex, un'esca non tossica per il monitoraggio dell'attività dei roditori
- Una volta che l'attività dei roditori è stata confermata, sostituire Detex con un'esca tossica, una trappola non tossica o una tavola collante
- Detex è uno strumento IPM adatto a scuole e altre applicazioni sensibili
- Fornisce importanti informazioni su dove collocare tavole e trappole collanti o su come apportare aggiunte o modifiche nell'utilizzo di questi strumenti
- Disponibile sia sotto forma di Blox che di esca morbida



FISSAGGIO delle stazioni di adescamento antimanomissione

IMPORTANTE:

Prima di utilizzare qualsiasi rodenticida, è importante ispezionare l'area prevista per l'utilizzo. Nell'eventualità che cani, altri animali domestici o bambini abbiano accesso all'esca, **è obbligatorio utilizzare l'apposita stazione di adescamento antimanomissione.**

STAZIONI DI ADESCAMENTO DOTATE DI PESO

Le stazioni con peso incorporato costituiscono un'opzione di fissaggio pronta all'uso dall'aspetto professionale.

ALTRI METODI

FISSARE A:

- Calcestruzzo/
blocchi di rivestimento
di terrazze
- Asfalto
- Terreno naturale
- Piastrelle
- Legno
- Superfici verticali
(pareti, tubi, recinzioni)

STRUMENTI DI FISSAGGIO:

- Chiodatrice/avvitatore
per calcestruzzo
- Adesivi da costruzione
- Nastro biadesivo
- Velcro
- Filo spinato
- Tasselli Duckbill
- Chiodi
- Viti
- Catene



La linea completa di stazioni di adescamento conformi ai più rigorosi standard dell'EPA (US).

Progettate, sviluppate e testate secondo le norme più rigorose applicabili in materia, queste stazioni hanno dimostrato la massima resistenza alle manomissioni ad opera di bambini e cani.

PRE-ANCORATA



- ▶ Stazione ancorata con peso in cemento incorporato
- ▶ Dotata di meccanismo di blocco singolo per una rapida manutenzione e vassoio estraibile per facilitarne la pulizia

VERSATILE



- ▶ Questa stazione con profilo ribassato può contenere sia 4 aste verticali per esche sia 1 trappola meccanica
- ▶ Dotata di meccanismo di blocco singolo per una rapida manutenzione e vassoio estraibile per facilitarne la pulizia

DISCRETA



- ▶ Camuffamento integrato con prese esterne simulate che la fanno sembrare un quadro elettrico
- ▶ Dotata di meccanismo di blocco singolo per una rapida manutenzione e vassoio estraibile per facilitarne la pulizia

PROFILO RIBASSATO



PROTECTA® LP

- ▶ Un classico del settore, provvisto ora della comprovata caratteristica di resistenza alle manomissioni da parte di cani e bambini
- ▶ Forma triangolare progettata per applicazioni angolari, profilo ribassato per spazi ristretti

SCENA DEL CRIMINE - VIETATO L'INGRESSO



Deceduto



CHAUCER HOUSE, CHAUCER ROAD, SUDBURY SUFFOLK CO10 1LN UNITED KINGDOM

TEL: +44 1787 379 295 • FAX: +44 1787 883 353 • emea@belllabs.com • www.belllabs.com

BELL LABORATORIES, INC. MADISON, WI 53704 USA