

DERATION PARAFFINATO


BIOCIDA

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, con Denatonio Benzoato.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

| | | |
|---|---|-------|
| Bromadiolone puro | g | 0,005 |
| Denatonio benzoato puro | g | 0,001 |
| Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a | g | 100 |



IL PRINCIPIO ATTIVO

DERATION PARAFFINATO è da 6 a 10 volte più potente rispetto alle esche a base di anticoagulanti della vecchia generazione (Warfarin, Clorofacinone, ecc.). Come gli altri anticoagulanti, agisce opponendosi alla formazione della protrombina necessaria alla coagulazione del sangue provocando delle emorragie letali.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, DERATION PARAFFINATO contiene Denatonio Benzoato, che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, quindi, se ne cibano avidamente.

LE CARATTERISTICHE

La ricerca di nuovi rodenticidi capaci non solo di combattere la resistenza sviluppatasi verso gli anticoagulanti tradizionali nel *Rattus rattus*, nel *Rattus norvegicus* e nel *Mus musculus* ma anche di migliorare il controllo nei roditori non-resistenti, ha portato allo sviluppo di una nuova generazione di anticoagulanti dotati di eccezionali qualità sia come ratticidi sia come topicidi. DERATION PARAFFINATO è un'esca rodenticida che appartiene a questa categoria di anticoagulanti.

L'APPLICAZIONE

DERATION PARAFFINATO è un'esca rodenticida pronta all'uso efficace contro topolino domestico (*Mus musculus*), ratto bruno (*Rattus norvegicus*), ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione.

DERATION PARAFFINATO per uso professionale può essere usato all'interno e intorno gli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

Utilizzare le esche finite e pronte all'uso all'interno degli appositi contenitori per esche già in commercio ("mangiatoie", "erogatori", "stazioni" ecc.) per evitare dispersione di esca nell'ambiente e l'accesso ai bambini, animali domestici e animali non bersaglio.

Osservare l'area di infestazione, porre i contenitori che contengono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza fra loro.

e dosi consigliate sono:

- Topolino domestico: 2 esche (40 g) x 100 mq
- Ratto grigio e ratto nero: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure di primo soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste.

LA FORMULAZIONE

DERATION PARAFFINATO è un topicida in blocco paraffinato da 20 g contenuto nella confezione Pratika, facile da trasportare e richiudibile.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Prodotto Biocida (PT 14). Uso professionale.

Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2013/00085/AUT

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - DERATION PARAFFINATO è classificato (H360D) può nuocere al feto e (H372) provoca danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.



PERICOLO

colkim.it

