

Scheda Tecnica

Data Rev: 13.01.2	017 Rev. N.	: 1	Mod:	4.1.2. IT
-------------------	-------------	-----	------	-----------

1. NOME COMMERCIALE: PATCH FEROMONE PER PLODIA INTERPUNCTELLA, EPHESTIA KUEHNIELLA, EPHESTIA ELUTELLA, CADRA CAUTELLA, CADRA FIGULIELLA.

Erogatore di feromone da inserire all'interno di una trappola per il monitoraggio di *Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Ephestia elutella*, *Cadra cautella*, *Cadra figuliella*, da impiegare all'interno di monitoring devices utili all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015. Tali dispositivi sono da utilizzare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito.

- 2. CODICE PRODOTTO: P-16003
- 3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

L'erogatore di feromone su menzionato è un dispositivo di rilascio graduale del feromone sessuale, ed è in grado di attrarre i maschi. E' da impiegare all'interno di una trappola in modo che l'azione di richiamo del feromone porti alla cattura degli infestanti, bloccandone il proliferare e, conseguentemente, arrestando l'infestazione.

Esso è composto da:

- Tessuto laminato ottimizzato per il rilascio graduale nel tempo;
- Adesivo;
- Feromone sessuale.

E' confezionato in barriera triplice accoppiato CARTA-ALU-PE.

Misure:

Lunghezza: 33 mm;Altezza: 21 mm.



Scheda Tecnica

Data Rev:	13.01.2017	Rev. N.:	1	Mod:	4.1.2. IT
-----------	------------	----------	---	------	-----------

Colore: come da immagine riportata.

5. MODALITA' D'USO:

Collocare il patch feromone per tarme alimenti all'interno di trappole quali Omnia Trap (cod: P-04009), Multitrap (cod: P-04042), Politrap (cod: P-04024), Easy Trap (cod: P-04078), Store Trap (cod: P-04028) e Lepibag (cod: P-04004). Tali trappole devono essere collocate ad un'altezza di 1,8 -2 m massimo.

Tali dispositivi devono essere impiegati all'interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, mulini, dispense, e tutte quelle realtà dove vengono lavorati e stoccati: farine, cereali, biscotti, pane, pasta, cioccolato, cacao, dolciumi, frutta secca, noci, ecc.

E' consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Area di copertura teorica: 200 m².

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Frequenza controlli consigliata: sostituire l'erogatore di feromone dopo tre mesi.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni. Dall'apertura della confezione, il feromone dura 90 giorni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI

- Confezione da n.1 pezzo;
- Imballo: 1000 pz.

7. SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.